

Sobredosis de drogas en Tennessee

3,826 residentes de Tennessee murieron debido a una sobredosis de drogas en 2022.

Las muertes relacionadas con **Fentanilo** aumentaron entre 2017 y 2021 **446%**.¹

Nuevas sustancias como la **Xilazina** un sedante de uso veterinario contribuyó a 324 muertes por sobredosis en TN entre 2019 y 2022.²

¿Cómo se pueden prevenir las sobredosis de drogas?

Almacene y deseche los medicamentos debidamente



Apoye Coaliciones locales de Prevención del Uso de Sustancias



Porte Naloxona

Participe en eventos de devolución de drogas



Hable con familiares y amigos sobre el uso de sustancias



Área de Alta Concentración (HIA)

Programas administrados por Coordinadores de Respuesta al Uso Indebido de Sustancias para lograr una respuesta más integral, equitativa y gestionada localmente en las áreas de TN más afectadas por la epidemia de sobredosis.

Visite el sitio web para obtener más información sobre la labor de las HIAs del área Occidental, Media, Sudeste, Este y Noreste administradas por la Oficina de Coordinación de Respuesta a Sobredosis (ORCO) del Departamento de Salud de TN.

Para acceder al sitio web de ORCO, escanee el código:



Cronologías de tendencias de sobredosis de drogas letales. Gobierno del estado de Tennessee - TN.gov. (n.d.). <https://www.tn.gov/health/health-program-areas/pdo/pdo/data-dashboard.html>

- [areas/pdo/pdo/data-dashboard.html](https://www.tn.gov/health/health-program-areas/pdo/pdo/data-dashboard.html) Korona-Bailey, J., Onyango, E. M., Hall, K., Jayasundara, J. H., & Mukhopadhyay, S. (2023). Sobredosis de drogas letales y no letales relacionadas con Xilazina en Tennessee de 2019 a 2022. JAMA Network Open, 6(7), e2324001-e2324001.
- <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.24001>

Financiado por el Departamento de Salud de Tennessee, la Oficina de Coordinación de Respuesta a Sobredosis y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, con fondos de la subvención NU17CE010208, Sobredosis: De los Datos a la Acción en los Estados.



Autorización No. 355998 del Departamento de Salud de Tennessee. Numero de ejemplares: 2400. Mayo 2024. Este documento público se divulgó con un costo de \$0,25.

Prevención, Reversión y Ayuda con Sobredosis de Drogas en todo Tennessee

Oficina de Coordinación de Respuesta a Sobredosis

www.tn.gov/health/orco



Puede correr mayor riesgo de SOBREDOSIS

Si usted...

- Ha tenido una sobredosis previa
- Padece de trastorno por uso de sustancias
- Usa más de una sustancia (conocido como uso de múltiples sustancias)
- Su suministro está expuesto a Fentanilo o Xilazina (conocida como "Tranq")

Recuerde,

La mayoría de las sobredosis son ACCIDENTALES.

SOBREDOSIS DE OPIOIDES

Signos de advertencia



Labios y uñas morados



Mareos y desorientación



Respiración lenta o no respira



Piel fría y/o pegajosa



Dormirse o dificultad para despertarse



Sonidos de ahogamiento o gorgoteo



Pupilas contraídas

Reversión

Si sospecha una sobredosis de opioides...

INMEDIATAMENTE

- USE NALOXONA si la tiene
- Llame al 911
- Mantenga a la persona despierta
- Ponga a la persona de lado para evitar asfixia
- Quédese hasta que llegue ayuda



Dónde obtener Naloxona:



- Departamento de Salud Local (suministros limitados)
- Farmacia

Para Prevención de Sobredosis y Recursos Contacte:

Capacitación Virtual:

<https://apps.health.tn.gov/naloxone/savealife/>

Agencia o Individual:

[TN.gov/behavioral-health/ROPS](https://www.tn.gov/behavioral-health/ROPS)

¿Necesita Tratamiento?

findhelpnowtn.org

Visite el sitio web para encontrar tratamiento para trastornos por uso de sustancias.



Llame o envíe un mensaje de texto 24/7/365 para remisiones a tratamiento para la adicción.